

لووس القاشده



لوسط دارو

بييتنگاه ايرانيان

شرکت تضمين کیفیت آزمایشگاه های پزشکی

گردآوری، تدوين و تالیف

دکتر حمیدرضا امینی

DRUG INDUCED LUPUS

آزمون های تشخیصی:

ANA Screen (HEP-2 cells), Anti-histones, ANCA-IIF, Anti-Cardiolipin

موارد استفاده از آزمون های فوق:

در بیماران مشکوک به بیماری لوپوس در اثر مصرف دارو و یا واسکولیت

سابقه بالینی: مصرف بعضی از داروها عوارض جانبی را در بر دارد که از طریق مکانیسم های متعدد سبب سندرم های شبه لوپوس می گردند. این داروها ممکن است که باعث فعال شدن یک لوپوس نهفته در بیمار شوند و یا باعث سندرم جداگانه ای به نام "سندرم لوپوس القا شده در اثر مصرف دارو" گردند. علائم شامل تب، درد عضلانی، آرتریت و راش می باشد. تاثیرات کلیوی و دستگاه عصبی غیرمعمول می باشد. بین بیماری لوپوس و لوپوس القا شده ناشی از مصرف دارو تفاوت هایی وجود دارد که در جدول زیر این اختلافات را مشاهده می کنید:

Phenomenon	SLE	Drug Induced Lupus
Age	20-40	50
Women: Men	9:1	1:1
Onset	Gradual	Abrupt
Arthralgia	90%	95%
Rashes	74%	10-20%
Renal Effects	53%	5%
CNS Effects	32%	0%
ANA	95%	95%
Anti-Sm	20-30%	Unusual
Anti-histones	80%	90%
Complement	Activated	Normal

Organ Symptoms in SLE and Drug Induced Lupus.

داروهایی که عمدتاً در ارتباط با بیماری لوپوس القا شده ناشی از مصرف دارو هستند عبارتند از:

Procainamide, Hydralazine, Diltiazem and Anti-TNF

Reference:

1. Schur P, Rose B. Drug-induced lupus. UpToDate; 2008 [updated 2008 September 21 2007; cited 2008 Apr 21].



سببیتنگاه ایرانیان

شرکت تضمین کیفیت آزمایشگاه های پزشکی